

SESIÓN CLÍNICA INTERACTIVA

PACIENTES CARDIOVASCULARES

CARDIO 6

Mujer, 57 años. Actualmente en tratamiento con Eutirox® 50 y enalapril/hidroclorotiazida.

Acude a consulta con una prótesis fija en el sector anteroinferior en muy mal estado y que debe ser retirada realizándose las extracciones de los dientes afectados. Se ha valorado realizar posteriormente una prótesis fija sobre dos implantes en esa zona.



CARDIO 7

Varón, 82 años. En 2010 le fue implantada una válvula mitral Actualmente está en tratamiento con Disgrén® (triflusal) 300 mg/día. Además en tratamiento con atorvastatina, Zyloric®, y metformina.

Acude a consulta presentando afectación periodontal, con bolsas profundas y movilidad grado 3, en el grupo incisivo inferior.



CARDIO 8

Mujer, 80 años. ACVA en 2013 que fue tratado con corticoides. Osteoporosis (Aclasta® V.O.) y actualmente tomando otro bifosfonato I.V. Además HTA (Perindopril®, Coropres®, indapamida), anemia (Tardyferon®, Acfol®), isquemia cerebral (Somazina® 50), osteoporosis (Calcio D Isdín®, Rocaltrol®), complementos alimenticios (Antigán®, Defenvid®, Mineraxín®), y glaucoma (Torbadrex®, Timoftol® y Azarga®).

Además refiere sensaciones desagradables, vagas, mal definidas, de ardor y escozor en la cavidad oral. No fumadora. Resto de antecedentes sin interés.

Desdentada total. Presenta gran movilidad en ambas prótesis, sobre todo en la inferior. Acude para la colocación de dos implantes en mandíbula para soportar sobredentadura.

CARDIO 9

Varón, 82 años. Actualmente en tratamiento con cianocobalamina, Minitrán®, Adiro®, clopidogrel, tamsulosina, Carvedilol®, paracetamol, Dianbén®, amlodipino, gabapentina, omeprazol, Aricept®, Aldactone® y sinvastatina.

No fumador. Resto de antecedentes sin interés

Acude para la extracción de dos molares fracturados y otros seis restos radiculares para posteriormente realizar dos prótesis parciales removibles.

CARDIO 10

Varón de 92 años en situación de insuficiencia cardiaca e insuficiencia respiratoria con datos de agudización de EPOC. Actualmente en tratamiento con: O² a 2 l./min. 15 horas al día, Xarelto® 20 mg. 1 comp/d, digoxina 0,25 mg. 1 comp/d, enalapril 5 mg 1 comp/d, furosemida 40 mg. 1 comp/d, Spiriva Respimat® 2 inhalaciones al día, Urbasón® 16 mg, 1 comp/d, tamsulosina 0,4 mg 1 comp/d, omeprazol 1 comp/d, Duphalac 1 comp/d si es necesario para deposición.

Resto de antecedentes sin interés

El paciente es portador de dos prótesis completas desde hace más de veinte años. Presenta desde hace una semana una tumefacción, muy dolorosa, en la zona más anterior del reborde alveolar superior que le impide utilizar la prótesis superior. Se realiza una radiografía periapical de la zona.

